

مقایسه تاثیر رایحه‌درمانی با عصاره‌های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندروم کرونری حاد

رسول فرائی^{۱*} (M.Sc)، ناهید ساقی^۲ (B.Sc)، ملیحه نصیری^۳ (Ph.D)، احمد جعفری خیرآبادی^۴ (M.Sc)

۱- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

۲- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

۳- گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۴- بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی، دانشگاه علوم پزشکی تربیت حیدریه، تربیت حیدریه، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۲/۲۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۷/۲۰

irrgh1991@gmail.com

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۵۵۳۲۵۴۴۸

چکیده

هدف: بیماران قلبی به دلیل روند بیماری از اختلالات خواب رنج می‌برند. یکی از روش‌های درمان اختلالات خواب، رایحه‌درمانی می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه تاثیر رایحه‌درمانی با عصاره‌های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندروم کرونری حاد صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی بر روی ۱۲۰ بیمار بستری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت. نمونه‌ها به صورت تصادفی در چهار گروه رایحه‌درمانی با عصاره پرتقال، عصاره بهارنارنج، عصاره ترکیب پرتقال-بهارنارنج و گروه شاهد تقسیم شدند. سه گروه تحت رایحه‌درمانی با این دو عصاره قرار گرفتند. در گروه شاهد تنها مراقبت‌های معمول صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه کیفیت خواب بیمارستان سنت‌ماری و فرم مشخصات جمعیت‌شناختی بود.

یافته‌ها: میانگین زمان خواب در گروه بهارنارنج $3/5 \pm 0/4$ ساعت، گروه پرتقال $7/5 \pm 0/4$ ساعت و گروه ترکیب پرتقال-بهارنارنج $8/5 \pm 0/4$ ساعت بود که نسبت به گروه شاهد $5/4 \pm 0/4$ معنی‌دار بود ($P=0/000$). میانگین نمره کیفیت خواب در گروه پرتقال، بهارنارنج و ترکیب پرتقال-بهارنارنج نسبت به گروه شاهد معنی‌دار بود ($P=0/0008$). مقایسه میانگین نمره کیفیت خواب در گروه رایحه‌درمانی ترکیبی نسبت به دو گروه رایحه‌درمانی منفرد معنی‌دار بود ($P<0/05$). همچنین مقایسه کیفیت خواب در دو گروه پرتقال و بهارنارنج معنی‌دار نبود ($P=0/082$).

نتیجه گیری: رایحه‌درمانی با عصاره‌های پرتقال و بهارنارنج به صورت منفرد و ترکیبی با تاثیر مثبت بر کیفیت خواب می‌تواند به عنوان یک اقدام مکمل در مراقبت‌های پرستاری مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: رایحه‌درمانی، خواب، بهداشت خواب، سندروم کرونری حاد، مركبات

سندروم متابولیک و مقاومت به انسولین می‌گردد [۳]. اختلال خواب باعث ترشح کاتکول آمین و افزایش قابل توجه فعالیت سمتاپاتیک می‌شود. افزایش فعالیت عصب سمتاپاتیک عروق و سطح کاتکول آمین‌ها باعث افزایش حاد مقاومت عروق محیطی و افزایش فشار خون شبانه می‌شود. فشار خون روزانه بالا و طولانی از عواض ثانویه در بیماران مبتلا به برخی از اختلالات خواب است. اختلال خواب باعث افزایش اختلال عملکرد عروقی می‌شود و این عامل سبب آسیب اکسیداتیو و در نتیجه آزاد شدن واسطه‌های التهابی مانند سیکلوکسیترناز، فاکتور نکروز تومور-α (TNF-α) و اینتلرلوکین (Interlukin) (Tumor Necrotizing Factor) و اینتلرلوکین (Interlukin) (Interlukin) و به دنبال آن اختلال تنفس در خواب

مقدمه

خواب یک رویداد فیزیولوژیک منظم، تکرارشونده و برگشت‌پذیری است که فرد در آن دچار کاهش سطح هوشیاری، از کار افتادن نسیی عضلات اسکلتی ارادی و نیز بالا رفتن قابل توجه آستانه واکنش به حرکت‌های خارجی می‌شود [۱]. بیش از یک سوم طول عمر انسان‌ها در خواب سپری می‌شود. بنابراین هر گونه اختلال در کیمیت، کیفیت و یا الگوی خواب می‌تواند تأثیر منفی چشمگیری بر عملکرد و سلامت جسمی و روانی فرد داشته باشد [۲].

اختلال در کیمیت و کیفیت خواب با تغییرات متابولیکی مرتبط است که منجر به بیماری‌های قلبی عروقی، پر فشاری خون،

استفاده کنترل شده از روغن های معطر برای حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی می باشد که به عنوان بخشی از طب مکمل در پرستاری سایر کشورها مانند انگلستان، آلمان، کانادا و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است [۱۲]. بوی حاصل از رایحه درمانی با تاثیر بر بخش لیمیک مغز می تواند باعث افزایش حس آرامش در بیماران شود [۱۳].

در طب سنتی ایران، از گل های گیاه بهارنارنج و اسانس پرتقال به عنوان آرامش بخش، ضد تشنج و برطرف کننده تپش قلب و خواب آور استفاده می شود. به لحاظ اینمی توسط FDA آمریکا تایید شده است [۱۴-۱۹]. میزان عملکرد عرق بهارنارنج در کاهش اضطراب به اندازه داروی دیازپام است پس می توان آن را جایگزین داروی دیازپام نمود. همچنین استنشاق اسانس پرتقال در کاهش اضطراب بیماران همودیالیزی مؤثر بوده و عارضه مهمی نداشته است. ضیغیمی در مطالعه خود (۱۳۹۳) عنوان می کند که عصاره بهارنارنج سبب عمیق شدن خواب و نصف شدن تعداد دفعات بیدار شدن از خواب در نیمه شب و رضایت از خواب شب گذشته می شود [۱].

درخت نارنج (*Citrus aurantium*) به جنس (*Citrus*) و خانواده مرکبات (*Rutaceae*) تعلق دارد. گل های درخت بهارنارنج، یکی از معطرترین گل های مرکبات است که سفید و دو جنسی بوده و هم به صورت آپوماتیک و هم با کمک حشرات، گردهافشانی می شود. از قسمت های متفاوت گونه های مختلف جنس *Citrus* نظری: میوه، پوست، برگ و ریشه، استفاده های مختلفی می شود؛ چرا که جنس های مختلف *Citrus* حاوی ترکیبات فعالی مثل: کومارین، فلاونوئیدها و مونوتربنؤئیدها، استات و هیدروکربن ها می باشند. نارنج از جمله گیاهان دارویی پر مصرف و بومی کشور ایران است [۲۰، ۲۱].

پرتقال نیز گیاهی درختی و از تیره نارنج است که در نواحی مختلف شمال و جنوب ایران پرورش می یابد و از نظر دارویی برای درمان سرماخوردگی، اختلالات کبدی، مشکلات کیسه صفراء، روماتیسم، شوک روحی، ناراحتی های گوارشی و لکه های پوستی استفاده می شود. برخی از مطالعات بالینی به اثرات ضد اضطرابی و بی خوابی استنشاق این اسانس اشاره شده و هیچ گونه عارضه جانبی جدی از آن تاکنون گزارش نشده است [۱۱].

کنعانی و همکاران (۱۳۹۱) عنوان می کند که استنشاق اسانس پرتقال در کاهش اضطراب بیماران همودیالیزی مؤثر بوده و عارضه مهمی نداشته است.

با توجه به شیوع بالای اختلالات خواب در بیماران بستری در بخش CCU و اهمیت برقراری خواب مناسب برای این بیماران، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه رایحه درمانی منفرد و ترکیبی عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران

می شود که خود باعث بیماری التهابی سیستمیک می گردد که در نهایت اختلال عملکرد آندوتیلیوم عروق و توسعه اختلالات شریانی را در بی دارد [۱].

شیوع بیماری های قلبی در طی دو قرن گذشته رو به افزایش بوده، به طوری که در حال حاضر این بیماری به عنوان علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در جهان شناخته می شود و ۵۰ درصد کل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و بیش از ۲۵ درصد مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد [۴]. این آمار در ایران رو به فزونی نهاده، به طوری که ۴۶ درصد میزان مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماری های قلبی - عروقی می باشد [۵، ۶]. برخی از محققان به وجود نوعی ارتباط بین اختلال خواب و حوادث قلبی بی بردگاند. خطر حملات ایسکمیک قلبی در افرادی که به طور مدام دارای خواب آشته هستند بیشتر بوده و بی خوابی با افزایش بیماری های ایسکمیک قلبی همراه است همچنین بی خوابی مزمن ممکن است سبب وقوع فیبریلاسیون دهلیزی شود [۷].

خواب راحت برای بیماران بخش های مراقبت ویژه قلبی (Cardiac Care Unit (CCU)) به دلیل پایش لحظه به لحظه، روشنایی بخش، سر و صدا بدليل مراقبت از سایر بیماران، تهويه مکانیکی، راه رفتن مکرر پرستاران، استفاده از داروهای آرامبخش و اینوتروپ، شدت بیماری و بیدار شدن بیماران زودتر از صحیح؛ گرچه این بیماران به خواب بیشتری در این بخش ها نیاز دارند، مشکل است [۸، ۹].

با توجه به تمامی تأکیدات و هشدارها راجع به اثرات نامطلوب محرومیت از خواب در بیماران بستری، به خصوص بیماران بستری در بخش CCU، هنوز بسیاری از بیماران از مسائل مربوط به خواب و اختلالات خواب رنج می برند که سبب افزایش هزینه های درمانی و طولانی شدن بستری آنان می گردد [۹]. در این راستا، شناسایی و درمان بیماران مبتلا به اختلالات خواب، یکی از اهداف مهم پرستاری می باشد. چرا که خواب بسیاری از بیماران بستری تحت عوامل مختلف دچار اختلال می شود [۱۰].

درمان رایج بی خوابی در حال حاضر درمان دارویی و استفاده از خواب آورهایی چون بنزو دیازپین ها است؛ اما از یک طرف با توجه به عوارض جانبی این داروها و از طرفی عدم وجود مسئولیت تجویز دارو به وسیله پرستاران، استفاده از روش های غیر دارویی ضروری به نظر می رسد. استفاده از درمان های تکمیلی و جایگزین به عنوان درمان کم خطر، مقرر به صرفه، آسان و با عوارض جانبی محدود در مراقبت پرستاری بسیاری از مراکز درمانی و مراقبتی رو به گسترش است. یکی از شیوه های طب مکمل، رایحه درمانی است [۱۱]. رایحه درمانی

قبل ارزیابی می‌نماید. این ابزار مسائل مربوط به خواب از جمله تاخیر در به خواب رفتن، بی‌قراری در طول خواب، شب بیداری و زود هنگام بیدار شدن از خواب را در افراد بررسی می‌کند. محدوده نمرات پرسش‌نامه بین ۱۱-۴۴ است که به گرینه با پاسخ هرگز نمره ۱، بسیار کم نمره ۲، تا حدی نمره ۳ و زیاد نمره ۴ اختصاص داده می‌شود. پایین‌ترین نمره اختلال خواب ۱۱ است که به عنوان عدم اختلال خواب تفسیر می‌شود و بالاترین نمره ۴۴ است که نشان‌دهنده بالاترین میزان اختلال خواب می‌باشد. امتیاز ۱۱-۲۱ نشان‌دهنده اختلال خواب خفیف، ۲۲-۳۲ نشان‌دهنده اختلال خواب متوسط و ۳۳-۴۴ نشان‌دهنده اختلال خواب شدید است. ابوالحسنی در مطالعه خود قابلیت اعتماد این پرسش‌نامه را با استفاده از آلفای کرونباخ ۰.۹۱ درصد و اعتماد (۰.۹۹) مورد تایید قرار داده است [۲۲].

پس از اخذ تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره IR.SBMU.RETECH.REC.1396.1196 IRCT20170312033035N2 لازم به بیماران داده شد و رضایت آگاهانه اخذ گردید. سپس فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی و توسط پژوهشگر برای بیماران تکمیل شد.

به منظور رایحه درمانی بر اساس مطالعه حریری و همکاران [۱]، شب راس ساعت ۲۲/۳۰ تمامی نمونه‌ها مراقبت‌های معمول خود را دریافت کرده و سپس گروه اول در معرض عصاره پرتفال تولید شده توسط شرکت باریج انسان کاشان که از پوست پرتفال تهیه شده بود و دارای لیمونن، فلاوندرن، سیترال (بر اساس وجود حداقل ۱۸ میلی‌گرم لیمونن در هر میلی‌لیتر فرآورده)، گروه دوم در معرض عصاره بهارنارنج تولید شده توسط شرکت آدونیس گل دارو که دارای حداقل ۰.۵ درصد Citrus Bioflavonoids گروه سوم در معرض عصاره ترکیب پرتفال- بهارنارنج قرار می‌گرفتند و گروه چهارم فقط مراقبت‌های معمول خود را دریافت می‌کردند. بدین صورت که بر روی یک گلوله پنبه ۳ قطره انسان ریخته می‌شد سپس از بیمار درخواست می‌شد تا به مدت یک دقیقه گلوله پنبه را استشمام کند. پس از آن گلوله پنبه در فاصله ۲۰-۲۵ سانتی‌متری سر بیمار قرار می‌گرفت تا در طی مدت زمان خواب نیز از آن استشمام نماید.

برای یکسان‌سازی محیط پژوهش هنگام نمونه‌گیری، هر چهار گروه به صورت همزمان تحت بررسی قرار گرفتند تا عوامل محرك موجود در بخش برای تمامی نمونه‌ها یکسان باشد. صحی روز بعد، پس از بیدار شدن بیماران، پرسش‌نامه سنت‌ماری به منظور بررسی کیفیت خواب شب گذشته بیمار توسط پژوهشگر تکمیل گردید. پس از جمع آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل توسط

بستری دچار سندروم حاد کرونری Acute coronary syndrome (ACS) در بخش CCU پرداخته است.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی بوده که بر روی ۱۲۰ بیمار بستری شده با تشخیص ACS در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان‌های امام حسین (ع)، لقمان حکیم و شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۷ صورت پذیرفت. نمونه‌های مورد مطالعه بر مبنای معیارهای ورود به صورت در دسترس انتخاب گردید و سپس به صورت تصادفی در چهار گروه عصاره پرتفال، عصاره بهارنارنج، ترکیب عصاره پرتفال و بهارنارنج و گروه شاهد قرار گرفتند. معیارهای ورود شامل سن بین ۳۰ تا ۷۵ سال، رضایت کتبی فرد برای ورود به مطالعه، بستری شدن بیمار با تشخیص سندروم حاد کرونری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی، گذشت حداقل ۲۴ ساعت از زمان بستری شدن، پایداری علائم حیاتی (نبض، دما، فشار خون، تنفس)، نداشتن مشکلات تنفسی شناخته شده مانند آسم، نداشتن اختلال بویایی، عدم ابتلا به بیماری‌های روانی و معیارهای خروج شامل اعتماد به مواد مخدوش، الکل و سیگار، استفاده از داروهای آرامبخش، ساقمه اگزما و آرثی نسبت به گیاهان، عدم رضایت از شرکت در مطالعه و وجود بحران‌های روانی مانند افسردگی، سوگواری و طلاق بود.

قبل از انجام مداخله نیز برای اطمینان از عدم وجود حساسیت به عصاره پرتفال و بهارنارنج، یک قطره از عصاره با غلظت ۲/۵ درصد، در گروه داخل ساعد دست غیر غالب بیمار مالیه شد و مدت ۲ ساعت بیمار تحت نظر گرفته شد، در صورت عدم بروز علائم حساسیت، بیمار وارد مطالعه گردید [۱]. حجم نمونه در هر گروه با خطای نوع اول ۵ درصد ($\alpha=0.05$) و توان ۰.۹۰ درصد ($\beta=0.10$) ۳۰ نفر محاسبه شد. از جدول آنالیز واریانس برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید. برای استفاده از این جدول تعداد گروه‌ها و کمیت $\Delta/5$ باید مشخص باشد، Δ انحراف معیار می‌باشد و Δ برابر تفاصل ماکزیمم و مینیمم میانگین نمره کیفیت خواب است که این کمیت با توجه به مطالعات قبلی ۱ در نظر گرفته شد [۱].

ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم مشخصات جمعیت‌شناختی مشتمل بر سن، جنس، وضعیت تاہل، شغل، میزان تحصیلات، سابقه استفاده از داروهای خواب‌آور، میزان فعالیت روزانه، استعمال دخانیات قبل از خواب، مصرف قهوه و یا چای قبل از خواب و پرسش‌نامه کیفیت خواب بیمارستان سنت‌ماری St. Mary's Hospital Sleep Questionnaire (SMHSQ) بود. این فرم شامل ۱۱ سوال است که مدت و کیفیت خواب را در شب

$5/4\pm 0/4$ بود. که این نتایج نسبت به گروه شاهد ($P=0/000$) همچنین در جهت افزایش معنی دار بود. همچنین مقایسه گروه پرتفال نسبت به گروه بهارنارنج ($P=0/001$) و گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج نسبت به گروه بهارنارنج به تهایی در جهت افزایش ($P=0/001$) معنی دار بود. اما مقایسه گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج و گروه پرتفال معنی دار نبود.

در بررسی ابعاد کیفیت خواب شب گذشته، تمامی ابعاد در گروههای مداخله نسبت به گروه شاهد در جهت کاهش معنی دار شده بودند. اما در مقایسه دو گروه رایحه درمانی با عصاره پرتفال و گروه بهارنارنج فقط ابعاد "میزان رضایت خواب شب گذشته"، "عمق خواب شب گذشته" گروه پرتفال نسبت به بهارنارنج در جهت کاهش و "تعداد دفعات بیدار شدن از خواب" در گروه پرتفال نسبت به بهارنارنج در جهت افزایش معنی دار بودند و بین سایر ابعاد کیفیت خواب رابطه معنی داری مشاهده نشد که در جدول شماره ۲ به تفضیل بیان شده است.

در بعد "میزان رضایت خواب شب گذشته"، در گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج نسبت به گروه شاهد از حالت "به طور متوسط ناراضی" به "کاملاً راضی" ($P=0/000$) تغییر کرده بود. بعد "عمق خواب شب گذشته" در گروه بهارنارنج نسبت به گروه شاهد از حالت "سبک" به "عمیق" ($P=0/025$) و در گروه پرتفال به حالت "نسبتاً عمیق" ($P=0/032$) و در گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج به "عمیق متوسط" ($P=0/005$) تغییر کرده بود. در بعد "تعداد دفعات بیدار شدن از خواب" در گروه پرتفال نسبت به گروه شاهد از حالت "سه تا چهار بار در طی شب" به "یک بار" ($P=0/019$) و در گروه بهار نارنج ($P=0/004$) و گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج ($P=0/006$) نسبت به گروه شاهد به حالت "هیچ" تغییر کرده بود.

در بررسی مقایسه دو گروه رایحه درمانی با عصاره های پرتفال و بهارنارنج با گروه رایحه درمانی با ترکیب پرتفال-بهارنارنج همه ابعاد به جز ابعاد "مشکل در به خواب رفتن"، "زمان خروج از رختخواب" و "تعداد دفعات بیدار شدن از خواب" در گروه رایحه درمانی با ترکیب عصاره های پرتفال-بهار نارنج در جهت کاهش معنی دار بود (جدول ۲).

عامل "بیدار شدن در صبح زود و عدم توانایی در خواب مجدد" در بیماران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۱۰ درصد (۳ نفر) نمونه ها در گروه پرتفال و ۲۱ نفر (۷۰ درصد) در گروه شاهد این مورد را تجربه نموده و در هیچ یک از نمونه های گروه بهارنارنج و گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج عامل بیدار شدن در صبح زود گزارش نگردید. نتایج بین گروه های مداخله و شاهد در جهت کاهش معنی دار بود ($P=0/001$). اما مقایسه بین دو گروه پرتفال و بهارنارنج و همچنین بین دو گروه

نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ صورت گرفت. نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف انجام شد. مشخصات جمعیت شناختی در چهار گروه با استفاده از آزمون کای دو و کروسکال والیس بررسی شد. مقایسه میانگین کیفیت با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی داری در تمام موارد $P<0/05$ در نظر گرفته شد.

نتایج

در طول پژوهش هیچ یک از نمونه ها از مطالعه خارج نشدند. میانگین سنی شرکت کنندگان 56 ± 7 سال بود. از بین ۱۲۰ نمونه مورد پژوهش ۵۳ نفر (۴۵ درصد) خانم و ۶۷ نفر (۵۵ درصد) آقا بودند. همچنین بین چهار گروه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی مصرف چای و قهوه قبل از خواب، مصرف دخانیات قبل از خواب و میزان فعالیت روزانه تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.

جدول ۱، مقایسه کیفیت خواب بیمارستانی سنت ماری را در چهار گروه نشان می دهد. در مقایسه میانگین نمره کیفیت خواب بین گروه شاهد و گروه های مداخله، میانگین نمره کیفیت خواب در سه گروه رایحه درمانی نسبت به گروه شاهد در جهت کاهش معنی دار بود ($P=0/001$). همچنین مقایسه میانگین کیفیت خواب بین دو گروه پرتفال و بهارنارنج با گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج، میانگین نمره کیفیت خواب در گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج در جهت کاهش معنی دار بود ($P=0/031$). اما مقایسه میانگین کیفیت خواب بیمارستانی سنت ماری دو گروه رایحه درمانی با عصاره پرتفال و عصاره بهارنارنج نیز معنی دار نبود.

جدول ۱ مقایسه میانگین کیفیت خواب بیمارستانی سنت ماری بعد از مداخله

		P-Value	میانگین نمره کیفیت خواب	گروه
$P=0/001$	$P=0/082$		$17\pm 3/5$	گروه رایحه پرتفال
			$15/6\pm 2/8$	گروه رایحه بهارنارنج
	$P=0/031$		$11\pm 0/5$	گروه ترکیب پرتفال و بهارنارنج
			$25/6\pm 5/1$	گروه شاهد

یافته های این پژوهش نشان داد که میانگین مدت زمان خواب بیماران در گروه بهارنارنج $6/5\pm 0/3$ ساعت و در گروه پرتفال $8\pm 0/7$ ساعت و در گروه ترکیب پرتفال-بهارنارنج

رایحه‌درمانی منفرد با رایحه‌درمانی ترکیبی نتیجه معنی‌داری مشاهده نشد.

جدول ۲. مقایسه ابعاد کیفیت خواب واحد‌های مورد پژوهش در سه گروه مداخله و گروه شاهد

P-value	میانگین رتبه	گروه	پرسش
۰/۰۰۰	۰/۰۰۲	۶۵/۱۳	رایحه پرتقال
		۴۸/۸۸	رایحه بهارنارنج
	۰/۰۰۳	۳۰/۶۸	ترکیب پرتقال-بهارنارنج
		۹۷/۳۰	گروه شاهد
۰/۰۰۱	۰/۰۲۱	۶۲/۱۰	وضعیت خواب
		۵۲/۹۵	شما دیشب چطور بوده است؟
	۰/۰۵۵	۲۸/۳۰	ترکیب پرتقال-بهارنارنج
		۹۸/۶۵	گروه شاهد
۰/۰۰۰	۰/۰۰۶	۶۱/۷۳	احساس بعد از بیداری از خواب
		۵۱/۸۷	صبح چگونه بود؟
	۰/۰۵۹	۲۷/۹۷	ترکیب پرتقال-بهارنارنج
		۱۰۰/۴۳	گروه شاهد
۰/۰۰۴	۰/۰۴۶	۶۴/۹۲	عمق خواب شب
		۴۷/۴۷	گذشته شما چگونه بود؟
	۰/۰۴۸	۲۸/۳۸	ترکیب پرتقال-بهارنارنج
		۱۰۱/۲۳	گروه شاهد
۰/۰۱۱	۰/۳۱۸	۵۳/۷۰	در به خواب رفتن
		۴۴	دیشب چقدر مشکل داشتید؟
	۰/۰۵۱	۴۵/۸۳	ترکیب پرتقال-بهارنارنج
		۹۸/۴۷	گروه شاهد
P-value	P-value	میانگین	گروه
۰/۰۰۸	۰/۰۵۱	۱۷±۷/۰۲	رایحه پرتقال
		۱۷/۵±۳/۸۸	رایحه بهارنارنج
	۰/۶۵۴	۱۱/۵±۵/۱	ترکیب پرتقال-بهارنارنج
		۳۰±۷/۱۲	گروه شاهد
۰/۰۱۳	۰/۰۵۵	۲/۳۳±۰/۹	رایحه پرتقال
		۱/۵±۰/۵	رایحه بهارنارنج
	۰/۰۴۰	۱/۴±۰/۵۶	ترکیب پرتقال-بهارنارنج
		۳±۱	گروه شاهد
۰/۰۰۰	۰/۰۴۴۴	۱۸/۶۶±۸/۰۸	رایحه پرتقال
		۱۶/۱۶±۴/۰۸	رایحه بهارنارنج
	۰/۷۳۵	۹/۲۳±۳/۵	ترکیب پرتقال-بهارنارنج
		۴۱/۶۶±۱۸/۴۹	گروه شاهد

می‌شود. هم‌چنین رایحه‌درمانی به صورت ترکیبی نسبت به منفرد تاثیری بیشتری بر بهبود کیفیت خواب دارد اما بین دو گروه پرتقال و بهارنارنج اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج مطالعه عبدالهی و همکاران در سال ۱۳۹۵ نشان داد که رایحه‌درمانی با عصاره بهارنارنج بر روی کیفیت خواب بیماران در گروه مداخله تاثیر مثبت دارد و بین گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی‌دار است ($P=0/000$) [۲]. ضامنگانی و همکاران

بحث و نتیجه‌گیری

این پژوهش به منظور مقایسه رایحه‌درمانی با عصاره پرتقال و بهارنارنج به صورت منفرد و ترکیبی بر کیفیت خواب بیماران بستری با تشخیص ACS در بخش CCU انجام گردید. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که رایحه‌درمانی با عصاره پرتقال و بهارنارنج هم به صورت ترکیبی و هم به صورت منفرد بر کیفیت خواب بیماران تاثیر مثبت دارد و باعث بهبود کیفیت خواب

نتایج این مطالعه در خصوص مقایسه عمق خواب، تعداد دفعات بیدار شدن در طی شب و رضایت کلی از خواب شب گذشته در سه گروه مداخله، تاثیر بیشتر رایحه‌درمانی ترکیبی نسبت به گروه بهارنارنج و آن را نسبت به گروه پرتقال عنوان می‌کند. در خصوص مدت زمان خواب در طی شب، نتایج نشان‌دهنده طولانی‌تر بودن خواب شب در گروه پرتقال و گروه ترکیب پرتقال-بهارنارنج نسبت به بهار نارنج بود. اما اختلاف معنی‌داری بین گروه پرتقال و ترکیب پرتقال-بهارنارنج مشاهده نشد. در واقع استفاده از عصاره‌های پرتقال و بهار نارنج در بیش از نیمی از موارد طرح شده در پرسشنامه کیفیت خواب و در تمام ابعاد کیفت خواب در فرم ترکیبی رایحه‌درمانی تاثیر مثبت داشته و سبب بهبود معنی‌دار در کیفیت خواب بیمارستانی شده است، که به تایید فرضیه تاثیر رایحه‌درمانی با عصاره‌های پرتقال و بهارنارنج کمک می‌کند. هم‌چنین بر اساس این نتایج، در صورتی که بیمار در هر یک از این ابعاد بیشتر ابراز نارضایتی کرد می‌توان به رایحه‌درمانی انتخابی نیز پرداخت.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده عصاره بهارنارنج دارای ۳۵ درصد از هیدروکربین‌های مختلف و ۴۷ درصد الكل ترپنی مانند لینالول، تریپنل، زرانیول، نرول، فلاونوئید و استات آن‌ها، ۱۱ درصد نزویلول و ۷ تا ۱۱ درصد ایندول می‌باشد. عصاره پرتقال نیز دارای ترکیبات لینالیل استات و لینالول می‌باشد. لینالول از طریق تعامل با GABA (گاما آمینو بوتیریک اسید) گیرنده، به عنوان یک آرام‌بخش در سیستم عصبی مرکزی عمل می‌کند. هم‌چنین لینالول استات دارای اثرات شبه مخدوش است. فلاونوئیدها نیز به عنوان آگونیست گیرنده‌های بنزودیازپینی عمل کرده و خواص آرام‌بخشی دارد [۲۶]. به نظر می‌رسد این موارد توجیه‌کننده علت یافته‌های پژوهش فعلی باشد و نشان‌دهنده سینرژیسم مثبت رایحه ترکیبی نسبت به منفرد می‌باشد.

این مطالعه هم‌چون سایر پژوهش‌ها دارای محدودیت‌ها و نواقصی است؛ که باید یافته‌های مطالعه را در این چارچوب نگریست. به این صورت که پژوهشگر قادر به کنترل بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت خواب بیماران شرکت‌کننده هم‌چون درد، ناراحتی، بیماری، بعضی از داروها، اضطراب، استرس، رژیم غذایی و عوامل محیطی هم‌چون نور، سرودصدا و آلام دستگاه‌ها و مراقبت‌های پرستاری نبود؛ گرچه تلاش گردید تا بسیاری از این عوامل کنترل گردد.

نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از رایحه‌درمانی با عصاره‌های پرتقال و بهارنارنج به عنوان طب مکمل و یا حتی در مواردی به صورت طب جایگزین می‌تواند سبب بهبود کیفیت خواب بیماران مبتلا به ACS شود. پرستاران نیز به عنوان افرادی که بیشترین زمان را در طی روند بستری با بیماران طی می‌کنند،

در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۴ با هدف تاثیر رایحه پرتقال بر کیفیت خواب کودکان سن مدرسه مبتلا به لوسمی لنفوپلاستیک حاد انجام داد و عنوان کرد که میانگین نمره‌ی کیفیت خواب بعد از مداخله در گروه آزمون ($74/86 \pm 8/94$) نسبت به قبل مداخله ($52/91 \pm 11/14$) به طور معناداری کمتر بود ($P=0/0001$) [۲۳]. در مطالعه کنونی نیز، میانگین نمره کیفیت خواب بیماران در گروه‌های مداخله نسبت به گروه شاهد معنی‌دار بود که نشان‌دهنده اثربخش بودن مداخله در بهبود کیفیت خواب بیماران بوده است. هم‌چنین با نتایج مطالعه‌ی بیون چو و همکاران در سال ۲۰۱۳ در کره جنوبی مبنی بر این‌که پذیرش شده در بخش‌های مراقبت‌های ویژه می‌شود هم‌خوانی دارد [۲۴]. این در حالی است که در مطالعه پیلکینگتون و همکاران در سال ۲۰۱۲ در انگلیس نتایج معنی‌داری در کیفیت خواب بیماران بستری در CCU مشاهده نشد [۲۵]. که این معنی‌دار نبودن ممکن است به دلیل پائین بودن حجم نمونه‌ها (۲۵ نفر) و مقدار اسانس استفاده شده (یک قطره) باشد.

خواب آلودگی در طی روز بر کیفیت زندگی فرد تاثیر منفی دارد هم‌چنین سبب افت کیفیت زندگی اجتماعی و فردی شخص می‌شود. لذا با شناسایی و کاهش عوامل تأثیرگذار در کاهش میزان خواب آلودگی روزانه می‌توان سبب بهبود کیفیت زندگی بیمار شد. نتایج یافته‌های این پژوهش نیز در بررسی ابعاد کیفیت خواب عنوان کردند که رایحه‌درمانی با عصاره‌های پرتقال و بهارنارنج به طور معنی‌داری باعث عمیق شدن خواب، کاهش تعداد دفعات بیدار شدن از خواب در نیمه شب، افزایش مدت خواب در شب، کیفیت خواب، احساس نشاط در طول روز، رضایت از خواب شب گذشته می‌گردد که تمام این موارد در کاهش میزان خواب آلودگی روزانه موثر است. ضیغمی و همکاران در مطالعه خود در سال ۱۳۹۴ و عبداللهی و همکاران در سال ۱۳۹۵ نیز در مطالعه خود به نتایج مشابهی دست یافته بودند و عنوان می‌کنند که استفاده از رایحه بهارنارنج سبب بهبود ابعاد کیفیت خواب می‌شود [۲۱، ۲۰]. میرغفوروند و همکاران در سال ۲۰۱۶ به بررسی تاثیر عصاره پرتقال بر کیفیت خواب مادران پس از زایمان پرداختند و عنوان نمودند که عصاره پرتقال بر کیفیت خواب مادران موثر است [۲۶]. هم‌چنین این نتایج همسو با مطالعه عبداللهی و همکاران در سال ۱۳۹۵ نیز بود [۲]. وجود اختلاف معنی‌دار بین رایحه‌درمانی به صورت ترکیبی با منفرد نشان‌دهنده تاثیر بیشتر رایحه‌درمانی ترکیبی نیز می‌باشد. هم‌چنین وجود اختلال خواب خفیف در دو گروه رایحه پرتقال و گروه رایحه بهارنارنج و عدم وجود اختلال خواب در گروه رایحه‌درمانی ترکیبی می‌تواند موید همین امر باشد.

quality of sleep among patients in coronary care unit of Ekbatan Hospital in Hamadan City, Iran. *Sci J Hamadan Nurs* 2014; 22: 60-69. (Persian).

[8] Nesami MB, Gorji MA, Rezaie S, Pouresmail Z, Chorati JY. The effect of acupressure on the quality of sleep in patients with acute coronary syndrome in cardiac care Unit. *Iran J Crit Care Nurs* 2014; 7: 7-14.

[9] Gunnarsdottir T, Jonsdottir H. Does the experimental design capture the effects of complementary therapy? A study using reflexology for patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. *J Clin Nurs* 2007; 16: 777-785.

[10] Amrollahi A, Salimi T, Farnia F, Lotfi MH. Comparison of the effects of aromatherapy with lavender essential oil and musicotherapy on sleep quality of burned patients. *Complement Med J* 2016; 6: 1490-1499. (Persian).

[11] Latifi M. The effect of aromatherapy with orange essential oils on sleep quality in the school-age children whit ALL. *Complement Med J* 2015; 5: 1113-1122. (Persian).

[12] Givi F, Esmaeili R, Mojtab F, Nasiri M, Shadnoush M. Effects of aromatherapy using lavender on the quality of sleep of hospitalized elderly. *Koomesh* 2019; 21: 254-261. (Persian).

[13] Karimollahi M. The effect of oral damask rose extract on anxiety of patients undergoing coronary angiography. *J Health Care* 2016; 18: 207-216. (Persian).

[14] Kanani M, Mazloom R, Emami A, Mokhayer N. Effect of orange essential oil aromatherapy on anxiety of patients undergoing hemodialysis. *J Sabzevar Univ Med Sci* 2012; 19: 249-257. (Persian).

[15] Bouya S, Ahmadidarehsima S, Badakhsh M, Balouchi A. Effect of aromatherapy interventions on hemodialysis complications: A systematic review. *Complement Ther Clin Pract* 2018; 32: 130-138.

[16] Kamalifard M, Farshbaf-Khalili A, Namadian M, Ranjbar Y, Herizchi S. Comparison of the effect of lavender and bitter orange on sleep quality in postmenopausal women: a triple-blind, randomized, controlled clinical trial. *Women Health* 2018; 58: 851-865.

[17] Rashidi-Fakari F, Tabatabaei-cher M, Mortazavi H. The effect of aromatherapy by essential oil of orange on anxiety during labor: A randomized clinical trial. *Iran J Nurs Res* 2015; 20: 661-664.

[18] Sharifipour F, Bakhteh A, Mirmohammad A. Effects of Citrus aurantium aroma on post-cesarean anxiety. *Iran J Obstet Gynecol Inf* 2015; 169: 12-20. (Persian).

[19] Hashemi S, Safari J, Sadeghi B, Ghafoori M. Evaluation of antioxidant activity of Bahar Narang (CitrusI Aurantium) extract in comparison to TBHQ in corn oil irradiated with UV Rays. *Iran J Food Sci Tech* 2017; 14: 97-104. (Persian).

[20] Abbasnia VS. The effect of citrus aurantium flowers aqueous extract on sleeping time and the level of anxiety in mice. *J Birjand Univ Med Sci* 2017; 23: 307-314. (Persian).

[21] Abdanipour A, Shadman B, Salimi NF, Bonabi R, Norian A. In Vitro evaluation of hydroethanolic extracts of citrus aurantium on proliferative rate of NSCs. *J Babol Univ Med Sci* 2014; 16: 36-40. (Persian).

[22] Khalili Z, Sadrollahi A, Aseman E, Gholipour F, Abbasian M. Evaluation factors associated with sleep quality in the elderly shahid Beheshti hospital of Kashan. *J Geriatric Nurs* 2016; 2: 32-43. (Persian).

[23] Alijani Ranani H, Noruzi Zamenjani M, Amin Asnafi A, Latifi M. The effect of aromatherapy with orange essential oils on sleep quality in the school-age children whit ALL. *Complement Med J* 2015; 5: 1113-1122. (Persian).

[24] Cho MY, Min ES, Hur MH, Lee MS. Effects of aromatherapy on the anxiety, vital signs, and sleep quality of percutaneous coronary intervention patients in intensive care units. *Evid Based Complement Alter Med* 2013; 4: 436-447.

[25] Fismal KL, Pilkington K. Lavender and sleep: A systematic review of the evidence. *Euro J Integrative Med* 2012; 4: 436-447.

[26] Mirghafourvand M, Charandabi SM-A, Hakimi S, Khodaie L, Galeshi M. Effect of orange peel essential oil on postpartum sleep quality: A randomized controlled clinical trial. *Euro J Integrative Med* 2016; 8: 62-66.

زمان لازم را برای انجام این گونه مراقبت‌ها که دارای هزینه پائین، غیر تهاجمی، در دسترس و این هستند را دارند و در کنار آن وجود این گونه مطالعات نیز شواهد علمی کافی را برای گنجاندن روش‌های طب مکمل در برنامه مراقبتی بیمار فراهم می‌کند. اگرچه رایحه‌درمانی به صورت منفرد با عصاره پرتقال و بهارنارنج سبب بهبود همه ابعاد کیفیت خواب نگردید اما رایحه‌درمانی ترکیبی با این رایحه‌ها بر همه ابعاد کیفیت خواب تاثیر مثبت داشت در مجموع سبب بهتر شدن کیفیت خواب بیماران شد و می‌تواند به عنوان یک برنامه درمانی در بهبود کیفیت خواب بیماران مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود تا در پژوهش‌های آتی به بررسی رایحه‌درمانی ترکیبی توأم سایر عصاره‌ها پرداخته شود تا با شناخت یک ترکیب مشخص بتوانند خلاصه‌های استفاده منفرد هر عصاره را در ابعاد کیفیت خواب پرمایید.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح مصوب شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره ثبت ۶۷۱۲۸/ص ۱۳۹۶ می‌باشد. از کمیته پژوهشی دانشجویان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای حمایت مالی از این مطالعه قدردانی می‌شود.

منابع

- [1] Zeighami R, Jalilolghadr S. Investigating the effect of "Citrus Aurantium" aroma on sleep quality of patients hospitalized in the coronary care unit (CCU). *Complement Med J* 2014; 4: 720-733. (Persian).
- [2] Mohaddes, Ardabili F, Abdollahi F, Najafi T, Hosseini F. The Effect of Aaromatherapy with Bitter orange extract on Sleep quality in Patient with type 2 diabetic. *Complent Med J* 2017; 2: 1851-1861. (Persian).
- [3] Belgürar K. An overview of the relationships between sleep and type 2 diabetes. *J Metabolic Invest* 2016; 1: 1-3.
- [4] Younessi Heravi M, Mojdekanlu M, Seyed Sharifi S, Yaghobi M. The role of cardiovascular risk factors in involvement of coronary arteries; A predictive model in angiographic study. *J North Khorasan University of Med Sci* 2014; 6: 199-215. (Persian).
- [5] Neishabory M, Ashke- E-Torab T, Alavi-Majd H. Factors affecting back pain among patients after cardiac catheterization. *Iran J Nurs* 2010; 23: 60-68. (Persian).
- [6] Avazah A, Khosh Fetrat M, Rahimi Bashar F. Effect of progressive muscle relaxation on the vital signs and oxygenation indexes in patients under coronary artery bypass graft surgery: A triple blinded randomized clinical trial. *Koomesh* 2019; 21: 423-436. (Persian).
- [7] Oshvandi K, Moghadarikosha M, Cheraghi F, Fardmal J, Nagshtabrizi B, Falahimia G. The impact of nursing interventions on

A comparative study on the effects of aromatherapy with orange and Citrus aurantium extracts on sleep quality in patients with acute coronary syndrome

Rasool Gharaee (M.Sc)^{*1}, Nahid Saghi (B.Sc)², Malihe Nasiri (Ph.D)³, Ahmad Jafari Kheyrabadi (M.Sc)⁴

1 - Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 - Student Research Committee of School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

3- Dept. Statistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4- Noh-e Dey Medical Education Hospital, Torbat Heydariyeh university of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

* Corresponding author. +98 9155325448 irrgh1991@gmail.com

Received:18 May 2019; Accepted: 12 Oct 2019

Introduction: Patients with heart disease suffer from sleep disorders due to the disease process. Aromatherapy is one of the ways to treat sleep disorders. The aim of this study was to compare the effect of aromatherapy with orange and citrus aurantium on sleep quality in patients with acute coronary syndrome.

Materials and Methods: This clinical trial study was performed on 120 patients admitted to selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Tehran, Iran) in 2019. The samples were randomly divided into four groups of aromatherapy with Orange extract, Citrus aurantium extract, Orange - Citrus aurantium extract and the control. The control group received only routine care. Data collection tools included St. Mary's Hospital Sleep Quality Questionnaire and demographic profile form.

Results: The mean sleep time in the Citrus aurantium group (6.5 ± 0.3 hours), the orange group (8 ± 0.7 hours) and the Orange-Citrus aurantium group (8 ± 0.8 hours) was significantly higher than the control group (5.4 ± 0.4 hours) ($p=0.000$). The mean score of sleep quality in the orange, Citrus aurantium and Orange-Citrus aurantium groups was significantly better than the control group ($p=0.0008$). The sleep quality score in the combined aromatherapy group was significantly higher than each group alone ($P<0.05$). No significant differences were found in the sleep quality between Orange and Citrus aurantium groups.

Conclusion: Aromatherapy with the combined Orange and Citrus aurantium extracts and each extract alone has a positive effect on sleep quality and can be used as a complementary measure in nursing care.

Keywords: Aromatherapy, Sleep, Sleep Hygiene, Acute Coronary Syndrome, Citrus.